

胃内視鏡検査を受けられる方へ

検査予約日時 月 日 () 時 分

当日は検査開始15分前にはご来院下さい。

食事について

- ① 検査前日の夕食は、午後9時頃までに軽く済ませて下さい。
夕食後はお茶、お水以外のものは取らないで下さい。
- ② 検査当日の朝食は取らずにお越しください。
- ③ 胃の粘液を除去するために検査1時間前までにコップ1杯程度のお水をお飲みください。(水のみ)

注意事項

- ① 血圧・心臓のお薬は、検査の2時間前までに必ず服用して下さい。
- ② 糖尿病のお薬を常用されている方は、内服中止が必要になることがあります。
事前にかかりつけの主治医にご相談ください。
- ③ 喫煙は胃液の分泌が多くなり検査に影響及ぼすことがありますので、当日は禁煙して下さい。
- ④ 検査の際に使用のお薬の影響で、検査当日はお車・自転車等の運転はできません。
- ⑤ 妊娠中、またはその疑いのある方は検査できませんのでお申し出ください。
また、授乳中の方は使う薬剤に制限が出る場合がありますのでご了承下さい。
- ⑥ マニキュアは、呼吸状態の観察の妨げになりますので除去して下さい。
除去していない場合、鎮静剤を使用する検査はできません。
- ⑦ 薬を内服している方は、別紙をご参照ください。
- ⑧ 市販のサプリメント・健康食品や処方薬ではないものは1週間前から服用を中止してください。

実際に検査を行なっている時間は、10～15分程です。

受付・準備・会計を含めると約1時間かかりますので、時間に余裕を持ってお越し下さい。

(鎮静剤を使用の場合はさらに休養時間として40～50分かかります)

検査終了後

- ① 検査後1時間は咽頭麻酔の影響のため、飲食・喫煙はできません。
- ② 生検を行われた方は出血予防のため検査後2時間、飲食・喫煙ができません。
また、検査当日はアルコール、香辛料の強いお食事は召し上がれません。

お願い

- ★検査は予約制です。予定時間までに来院されない場合やご連絡がない場合は検査に応じられないことがありますのでご注意ください。
- ★検査日時の変更が必要な場合はできるだけ早めにご連絡ください。
- ★諸事情により検査開始が遅れることがありますので、予めご了承ください。

医療法人財団 医親会 海上ビル診療所
千代田区大手町2丁目6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー10階
TEL 03-6636-6050

胃内視鏡検査説明・同意書

検査の目的・方法

食道、胃、十二指腸に潰瘍、腫瘍などの病変があるかを調べるために行ないます。内視鏡の先端にはビデオカメラが組み込まれており、外に設置された高精細テレビモニターの画像で観察します。ポリープ、潰瘍、腫瘍などが見つかった場合は、必要に応じて生検を施行します。

検査前に喉に軽い麻酔を行います。医師が必要と判断した場合や御希望される方には、静脈注射による鎮静剤を用いることもあります。当日の体調や内服薬の内容によっては検査方法のご希望に添えない場合があります。

注意事項

生検を行った場合は、稀に出血・穿孔（穴があくこと）などの偶発症を生じることがあります。偶発症の頻度は0.00694%(約14406人に1人程度)です。そのうち死亡に至る重篤な偶発症が0.000115%(約866591人に1人)です。また喉の麻酔、鎮静剤の使用により、呼吸抑制や薬が合わず副作用を生じることがあります。偶発症が生じた場合は最善の処置・治療を行ないますが、入院・緊急開腹手術が必要になる事もあります。

偶発症を予防するため、下記の項目に当てはまる方は事前にお申し出ください。

1. これまで歯科治療の際、局所麻酔などでアレルギー症状が出た方、気分が悪くなったことのある方（喉の麻酔はキシロカインを使用します）
2. 現在治療中の病気がある方、過去に入院治療歴がある方。
3. 抗血栓薬（抗凝固剤や抗血小板薬）を内服している方。

上記2,3に該当する方は、検査予約時に薬の服用方法については検査依頼医、看護師から説明を受け、必ず服用方法を守ってください。抗血栓薬については必ず処方医に事前に休薬の可否について御相談下さい。検査医の判断により生検できない場合もあります。また生検を希望されない方はあらかじめスタッフにお申し出ください。

検査後、鎮静剤などの影響により、眠気・視力低下、健忘等が現れることがあります。検査当日は車・バイク・自転車の運転、通常の業務などは避けてください。

私は、今回胃内視鏡検査に関して、必要性和その内容やこれに伴う危険性について十分な説明を受け、理解いたしました。

この検査の実施に_____（記入例：検査の実施に_____同意します_____）

署名または捺印_____年 月 日

（代諾者の場合、本人との続柄：_____）

※本人が未成年であるなど判断能力が十分でない場合、もしくは心身障害や重篤な病状などのため、署名不能の場合は、代諾者（配偶者、親権者または扶養義務者など）が署名または捺印して下さい。

住所_____

電話番号_____

医療法人財団 医親会 海上ビル診療所
千代田区大手町2丁目6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー10F TEL03-6636-6050

抗血栓薬内服中の方へ

内視鏡検査時の抗血栓薬の取り扱いについて

当診療所におきましては、原則抗血栓薬(抗凝固薬、抗血小板薬)を服用中の方でも、休薬なしで内視鏡検査を受けることができます。

* 服用の内容によりましては、生検を行わない場合もあります。
血栓塞栓発症リスクが低い症例に関しましては、主治医の判断により休薬できる場合もありますので、必ず事前に主治医にご相談ください。

内視鏡検査において、ポリープ・潰瘍・腫瘍などが見つかった場合、病変の一部を採取する生検検査を行うことがあります。

出血を伴うことがありますので、今までは、内服薬の抗血栓薬を一定期間休薬して検査を施行していました。

しかし、近年の報告により抗血栓薬の休薬により、命にかかわる脳梗塞・心筋梗塞を発症する可能性が高くなることがわかってきました。

複数の研究で抗凝固薬の休薬により約1%の頻度で脳梗塞や他の血栓性疾患を引き起こし、また、脳梗塞の患者さんが抗血小板薬を休薬することで脳梗塞再発の危険性が3～4倍に上昇するなどの報告がされております。

海上ビル診療所 院長

裏面に内視鏡検査に影響のあるお薬一覧がございます

内視鏡検査に影響のあるお薬一覧 Affects endoscopy drug List 2022.1

※休薬の可否については、必ず主治医にご確認ください。You have to check with your doctor about whether or not you can take medication.

成分名 Ingredient name	製品名 product name	後発医薬品(ジェネリック)・同成分薬 Generic drug・Same component drug
アスピリン aspirin	バイアスピリン Bayaspirin	アスピリン Aspirin
アスピリン・ダイアルミニウム配合 aspirin・dialuminate	バファリン Bufferin	アスファネート , ニトキス , ハッサミン , ファモター Asphanate , Nitogis , Bassamin , Famoter
アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合 aspirin・vonoprazan humarate combined drug	キャブピリン配合錠 Cabpirin	
アスピリン・ランソプラゾール配合 aspirin・lansoprazole combined drug	タケルダ配合錠 Takelda	
アピキサバン apixaban	エリキュース Eliquis	
イコサペン酸エチル ethyl icosapentate	エパデールS Epadel S エパデール Epadel	イコサペン酸エチル Ethyl icosapentate
エドキサバンチル酸塩水和物 edoxaban tosilate hydlate	リクシアナ Lixiana	
オメガ-3脂肪酸エチル Anti-hyperlipidemic Agents	ロトリガ Lotriga	
クロピドグレル硫酸塩 clopidogrel sulfate	ブラビックス Plavix	クロピドグレル Clopidogrel
クロピドグレル硫酸塩・アスピリン配合 clopidogrel sulfate・aspirin	コンプラビン配合錠 Complavin	ロレアス LoreAce
サルボグレレート塩酸塩 sarpogrelate hydrochloride	アンブラーグ Anplag	サルボグレレート塩酸塩 Sarpogrelate hydrochloride
ジピリダモール dipyridamole	ペルサンチン Persantin	ジピリダモール(+散) Dipyridamole
ジラゼプ塩酸塩水和物 dilazep dihydrochloride hydrate	コメリアン Comelian	ジラゼプ塩酸塩 Dilazep dihydrochloride
シロスタゾール cilostazol	プレタール Pletaal	シロスタゾール(+錠,OD錠,内服ゼリー) Cilostazol
ダビガトランエテキシレートメタンサルホン酸塩 dabigatran etexilate methanesulfonate	ブラザキサ Prazaxa	
チカグレロル ticagrelor	ブリリント Brilinta	
チクロピジン塩酸塩 ticlopidine hydrochloride	パナルジン Panaldine	チクロピジン塩酸塩 Ticlopidine hydrochloride
prasugrel hydrochloride	エフィエント Eflent	
ベラプロストナトリウム beraprost sodium	ケアロードLA Careload LA ドルナー Dorner プロサイリン Procylin ベラサスLA Berasus LA	ベラプロストNa , ベラプロストナトリウム Beraprost Na , Beraprost sodium
リバーロキサバン rivaroxaban	イグザレルト Xarelto	
リマプロストアルファデクス limaprost alfadex	オパールモン Opalmon プロレナール Prorenal	リマプロストアルファデクス Limaprost alfadex
ワルファリンカリウム warfarin potassium	ワーファリン Warfarin	ワルファリンK Warfarin K

※上記は、「今日の治療薬2022年版」を参照し作成しております。

The above reference and create "Today's remedy 2022 edition".

記載されていない後発医薬品(ジェネリック)が存在する場合がありますので、ご了承願います。

Please note, in some cases Generic drugs not listed.

※院内採用薬品は青字で表記しております。ご不明な場合はお問い合わせください。

Drugs used in hospitals are shown in blue.If you are unsure, please contact us.